

PROSTŘEDEK K PODPOŘE ZDRAVOTNÍHO STAVU ROSTLIN  
S VÝRAZNÝM VEDLEJŠÍM ÚČINKEM PROTI ŠKŮDCŮM



KONCENTRÁT  
VYSTAČÍ AŽ  
NA 20L POSTŘIKU

# BIOOL

PROSTŘEDEK VYROBENÝ POUZE  
Z POTRAVINÁŘSKÝCH SUROVIN

- Mšice
- molice
- puklice
- svlušky
- TRÁSNĚNKY AJ.

POVOLENO PRO BIOZAHŘÁDKÁŘENÍ  
A BIOZEMĚDĚLSTVÍ  
ŠETRNĚ KE ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM PODMÍNKÁM



NAŠE PŘÍPRAVKY

\*

ZDRAVÉ VÝPĚSTKY

## BIOOL

Pomocný prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený ke zlepšení zdravotního stavu zeleniny, ovocných dřevin, okrasných stromků a keřů a pokojových rostlin.

(jsou totožné)

Datum výroby a číslo šarže:

**Účinná látka:** Stolní řepkový olej 55%

**Výrobce:** AgroBio, Rokycany 630/III

**Balení:** Lahvička 200ml ( víčko 5ml )

**Registrační číslo:** 1515 - 2C

**Doba použitelnosti:** V původně uzavřeném obalu nejméně 12 měsíců od data výroby.

**Působení:** Prostředek s fyzikálním působením na živočišné škůdce. Působí dotykově, škůdce je třeba dokonale smáčet aplikační kapalinou (do počátku skanutí). Účinkuje na vajíčka, larvy, nymfy, i dospělé. Škudci hynou v průběhu několika hodin až dní (např. červci, puklice, štítenky) po ošetření.

**Návod na použití:**

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka	Poznámka
Zelenina, ovocné dřeviny, okrasné stromy a keře, pokojové rostliny aj.	Molice, trásněnky	1-2% (2-4 víčka/ 1l vody)	1
	Roztoči, mšice	2-3% (4-6 víčka/ 1l vody)	
	Červci, puklice, štítenky	3-5% (6-10 víček/ 1l vody)	
	Ostatní listoví škůdci	2-4% (4-8 víčka/ 1l vody)	

**Poznámka č.1**

Při silném výskytu škůdce lze dávku zvýšit až o 50%. Ošetření dle potřeby opakovat v intervalu 5-14 dní. Ošetřovat navečer nebo za oblačného počasí, **ne za prudkého slunce a vysokých teplot**. Při častějším opakování a vyšších koncentracích /především ve sklenicích/ doporučujeme rostliny omýt postřikem s jarovou vodou (10 - 15 kapek/1l) po každé druhé aplikaci. Zejména ze spodní strany listů.

**Příprava aplikační kapaliny:**

Obsah lahvičky důkladně protřepat a příslušné množství prostředku dokonale promíchat v postřikovací s vodou. K zajištění dobré účinnosti přidat na 1l aplikační kapaliny 5 - 7 kapek povoleného smáčedla (popřipadě "Jar" 10 - 15 kap.). **Kapalina musí škůdce smáčet, ne stéci.** Aplikační kapalinu spotřebovat do 24 hodin.

**Likvidace zbytků a obalů:**

Případné zbytky aplikační kapaliny zředit vodou a beze zbytku vyfýskat na bylinný porost půdy. Prázdné obaly od prostředku vypláchnout vodou a odevzdat do sběru.

**Čištění aplikačního zařízení:**

Po ukončení práce nádrž aplikačního zařízení vypláchnout vodou.

**Ochranná lhůta:**

(0 dnů.) Vyrobeno výhradně z potravinářských surovin

Výpěstky před konzumací omýt vodou.

**Pozor!**

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami.

Může ohrozit zdraví při požití.

Prostředek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu.

Při práci není nutný ochranný oděv ani rukavice.

Zabraňte kontaminaci vody přípravkem.

Zasažené oči vypláchnout vodou.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany

včel a zvěře. Pro ryby ve větší míře nebezpečný.

**Skladování:**

Skladovat v pevně uzavřené láhvi při teplotě 0 - 20°C.

Chraňte před přímým sluncem a před silnějšími mrazy.

